


## Enquête Démographique et de Santé (EDSM-VI) 2018

### Planification Familiale (PF)

16 % des femmes en union utilisent une méthode moderne de PF. L'utilisation des méthodes modernes a augmenté depuis 1987 quand 1 % des femmes en union utilisaient une méthode moderne.

**Tendance\* de l'utilisation de la planification familiale moderne**  
Pourcentage de femmes de 15-49 ans en union qui utilisent une méthode moderne




### Santé maternelle

43 % des mères ont effectué au moins 4 visites prénatales ; une augmentation depuis 2001 quand cette proportion était de 30 %.

Deux tiers (67 %) de naissances se sont déroulées dans un établissement de santé. Cette proportion a presque doublé depuis 2001.

**Tendances\* de la santé maternelle**

Pourcentage de femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des 5 dernières années qui ont effectué 4+ visites prénatales et pourcentage de naissances ayant eu lieu dans un établissement de santé




© 2015 Mali Health, avec la permission de Photoshare

### Vaccination

45 % des enfants de 12-23 mois ont reçu tous les vaccins de base à n'importe quel moment avant l'enquête. La couverture vaccinale de base n'a pas encore retrouvé son niveau de 48 % en 2006.

**Tendance\* de la couverture vaccinale**


Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les 8 vaccins de base



### État nutritionnel des enfants et allaitement

Au Mali, 27 % d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, 19 % présentent une insuffisance pondérale et 9 % sont émaciés. Entre 2006 et 2018, les prévalences du retard de croissance, de l'émaciation et de l'insuffisance pondérale ont diminué.


**Tendances\* de l'état nutritionnel des enfants**  
Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition



40 % d'enfants de moins de six mois sont exclusivement allaités— soit 5 fois plus qu'en 1995-1996 (8 %).

**Tendance\* de l'allaitement exclusif**

Pourcentage d'enfants de moins de 6 mois exclusivement allaités




### Paludisme

Près de 1 enfant sur 5 (19 %) a été testé positif pour le paludisme selon le test de diagnostic rapide (TDR). Cela représente une baisse sensible depuis 2012-2013, quand 47 % des enfants ont été testés positifs pour le paludisme.

**Tendance\* de la prévalence du paludisme**

Pourcentage des enfants de 6-59 ans ayant été testés positifs pour le paludisme (à Plasmodium falciparum) selon le test de diagnostic rapide



© 2018 UNICEF Mali/ Dicko

\*Les régions de Tombouctou, Gao et Kidal ont été exclues dans l'EDSM-V 2012-2013 et dans l'EIPM 2015.