




Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSN-MICS IV) 2012

Source d'approvisionnement en eau de boisson

Deux tiers des ménages nigériens (67 %) s'approvisionnent en eau de boisson auprès d'une source améliorée contre 41 % en 2006.


Pourcentage de ménages qui s'approvisionnent en eau de boisson auprès d'une source améliorée



Le niveau de mortalité des enfants

En 1992, environ un tiers des enfants n'atteignaient pas leur cinquième anniversaire. Le niveau de mortalité a fortement baissé : un enfant sur huit décède avant l'âge de cinq ans.

Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de cinq ans ayant précédé l'enquête




Santé de la mère

La proportion de mères qui ont effectué au moins les quatre visites prénatales recommandées et qui ont reçu l'assistance de personnel formé au cours de leur dernier accouchement a augmenté depuis 2006.

Pourcentage des :

EDSN-MICS III 2006 EDSN-MICS IV 2012




© UNICEF NIGER

Paludisme

L'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide (MII) par les enfants et les femmes enceintes est près de trois fois plus élevée en 2012 qu'en 2006.

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans et de femmes enceintes de 15-49 ans qui ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) la nuit précédant l'enquête




Plus d'un tiers des femmes enceintes (35 %) ont reçu le traitement préventif intermittent du paludisme recommandé.

Nutrition

L'état nutritionnel des enfants s'est légèrement amélioré entre 2006 et 2012.

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans selon leur état nutritionnel*

EDSN-MICS III 2006 EDSN-MICS IV 2012



*Selon les Normes OMS de la croissance de l'enfant adoptées en 2006



© UNICEF NIGER

