


Тестування на ВІЛ


Відсоток жінок і чоловіків віком 15-49 років, які будь-коли проходили тестування на ВІЛ



Лише 21% чоловіків і половина жінок перевірялись на наявність ВІЛ-інфекції та отримали результати аналізів. Такі відмінності зумовлені тим, що половина з жінок, які народжували дітей впродовж 2 років, що передували обстеженню, здійснили тестування на ВІЛ впродовж допологового догляду.

Вагітні жінки, яким були надані консультації та тестування на ВІЛ

Відсоток вагітних жінок, яким були надані консультації, запропоноване тестування на ВІЛ, яке вони пройшли та отримали результати



Жінки, що проживають в міських населених пунктах, та ті з них, що мають вищі рівні освіти, більш схильні до тестування на ВІЛ-інфекцію впродовж вагітності.

Додаткову інформацію про результати Медико-демографічного обстеження України в 2007 р. можна отримати:

в Україні:
Український центр соціальних реформ
26, вул. Панаса Мирного
Київ, 01011, Україна
Тел./факс: (380-44)280-8201
email: ucsr@mail.ru

Державний комітет статистики України
3, вул. Шота Руставелі
Київ-23, 01023, Україна
Тел.: +380-44-287-24-33
Факс +380-44-235-37-39
e-mail: office@ukrstat.gov.ua

в США:
MEASURE DHS
Macro International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Telephone: 301-572-0200
Fax: 301-572-0999
email: reports@measuredhs.com
www.measuredhs.com

Медико-демографічне обстеження України (МДОУ) в 2007 р. було здійснене Українським центром соціальних реформ та Державним комітетом статистики України. Macro International Inc. надала технічну допомогу у плануванні, реалізації та аналізі обстеження, яке є частиною проекту медико-демографічного обстеження (проекту МДО). Фінансування обстеження забезпечувалось Агентством міжнародного розвитку США (USAID).



Державний комітет статистики
Міністерство охорони здоров'я

Медико-демографічне обстеження України в 2007 р. (МДОУ-2007)



Фактичні дані щодо поінформованості

Основні результати з питань ВІЛ/СНІД за даними Медико-демографічного обстеження України в 2007 році (МДОУ-2007)

Медико-демографічне обстеження України в 2007 р. надає сучасну інформацію щодо населення України та стану його здоров'я. МДОУ-2007 є першим національним медико-демографічним обстеженням в країні, що містить інформацію з наступних питань: народжуваність та планування сім'ї, здоров'я матері та дитини, поінформованість щодо ВІЛ/СНІД, становище жінок, насильство в родині та інші питання здоров'я дорослого населення, зокрема - туберкульоз, гіпертензія, тютюнопаління та споживання алкоголю.

Базою обстеження є вибірка сукупність населення, що репрезентує все населення країни. Вона забезпечує оцінки для сільської місцевості та міських населених пунктів в країні в цілому та в кожному з 5 регіонів. Впродовж реалізації МДОУ були опитані 6841 жінка та 3178 чоловіків у віці 15-49 років.

Обізнаність про засоби запобігання ВІЛ

Відсоток осіб, які знають, що ВІЛ можна запобігти шляхом:




Майже все населення України (99%) поінформоване про СНІД. Близько 90% знають, що ВІЛ-інфекцію можна попередити шляхом використання презервативів або маючи статеві стосунки з одним неінфікованим партнером. Децю менше населення поінформовано про те, що утримання від сексуальних стосунків може обмежити ризик ВІЛ-інфікування.

Поінформованість з питань СНІД




Три чверті українців знають, що носієм вірусу СНІД може бути особа, яка виглядає здоровою. Більше, ніж дві третини не вірять в два найбільш поширені міфи про СНІД і знають, що СНІД не передається при поцілунках або через спільну їжу.

Всебічна обізнаність з питань ВІЛ за регіонами



Серед жінок, найкраща поінформованість з питань ВІЛ/СНІДу характерна для Центрального регіону, в той час як серед чоловіків - для Південного регіону.

Ставлення до захворювання на СНІД



В Україні досі існує багато забобонів, що пов'язані з ВІЛ. В той час як більшість українців піклувались би вдома про члена родини, що хворий на СНІД, майже всі з них прагнули б, щоб ВІЛ-позитивний статус цього члена сім'ї залишався таємним.

Секс з високим ступенем ризику і використання презервативів



Дві з десяти жінок і чотири з десяти чоловіків мали ризиковані статеві стосунки впродовж року, що передували обстеженню. Більше, ніж половина з них використовували презерватив в останній раз, коли вони мали ризиковані сексуальні стосунки.