


Santé de l'enfant : résultats de l'EDS-MICS

L'Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Cameroun de 2011 (EDS-MICS) fournit des informations sur la population et la santé. Au cours de l'enquête, 15 426 femmes de 15-49 ans et 7 191 hommes de 15-59 ans ont été interviewés. De plus, les informations ont été collectées sur la santé des enfants au cours des cinq dernières années.

Tendances de la mortalité


Décès pour 1 000 naissances vivantes pour la période de cinq ans ayant précédé l'enquête



La comparaison des résultats de l'EDS-MICS 2011 avec ceux des enquêtes précédentes révèle une tendance régulière à la baisse des niveaux de la mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Couverture vaccinale par antigène


Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés



Les résultats de l'EDS-MICS montrent que 87 % d'enfants de 12-23 mois ont reçu le vaccin du BCG, 68 % ont reçu les trois doses de DTCoq, 70 % ont reçu les trois doses de polio et 71 % ont été vaccinés contre la rougeole.

Tendances de couverture vaccinale

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés (le BCG, le vaccin contre la rougeole, trois doses de vaccin contre la poliomyélite, et trois doses de DTCoq)




La proportion d'enfants qui sont complètement vaccinés est passée de 41 % à l'EDSC-I de 1991 à 53 % en 2011.

Près d'un enfant sur huit meurt avant son cinquième anniversaire au Cameroun.

Vaccination des enfants par région

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés


Cameroun: 53 %



C'est dans la région du Nord-Ouest que la couverture vaccinale est la plus élevée (83 %) et dans la région de l'Extrême-Nord qu'elle est la plus faible (31 %).

Tendances du traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête et pour lesquels on a cherché un traitement




La proportion d'enfants ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête et pour lesquels on a cherché un traitement n'a pratiquement pas changé depuis l'EDSC-I de 1991.

68 % de mères de 15-49 ans connaissent les sachets de SRO utilisés pour le traitement de la diarrhée

Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition des enfants de moins de cinq ans ayant eu la diarrhée au cours des deux semaines précédant l'enquête par quantité de liquides donnés



Plus de la moitié (55 %) des enfants ayant eu la diarrhée ont bénéficié d'une augmentation des quantités de liquides pendant la diarrhée, comme recommandé.



Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples du Cameroun (EDS-MICS) 2011

Prévalence et traitement de la fièvre chez les enfants

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui :

Ont eu la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête **26**

Parmi les enfants qui ont eu la fièvre au cours des deux semaines précédant l'enquête, pourcentage qui :

Ont pris des antipaludéens **23**


Ont pris des antipaludéens le jour même ou le jour suivant **13**

Environ un quart des enfants de moins de cinq ans (26 %) ont eu de la fièvre au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête. Parmi eux, 23 % ont reçu des antipaludéens. La quinine est l'antipaludéen le plus fréquemment donné aux enfants qui ont eu de la fièvre.

Trois enfants de 6-59 mois sur dix étaient positifs au Test de Diagnostic Rapide (TDR) du paludisme.

Utilisation des MII selon l'âge de l'enfant

Pourcentage d'enfants de moins de cinq ans qui ont dormi sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) la nuit précédant l'enquête



Près d'un enfant de 0-4 ans sur cinq a dormi sous une MII la nuit précédant l'enquête. L'utilisation des moustiquaires est plus fréquente chez les enfants de moins de trois ans (<36 mois).

Pour tous renseignements concernant l'EDS-MICS 2011, contacter:

Au Cameroun :

L'Institut National de la Statistique (INS)
BP 134, Yaoundé, Cameroun
Téléphone : (237) 22 22 04 45
Fax : (237) 22 23 24 37
Internet : www.statistics-cameroon.org

Aux États-Unis :

MEASURE DHS, ICF International
11785 Beltsville Drive
Calverton, MD 20705 USA
Téléphone : 301-572-0200
Fax : 301-572-0999
Site web : www.measuredhs.com

L'Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDS-MICS 2011) a été réalisée au Cameroun de janvier à août 2011 par l'Institut National de la Statistique (INS), en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique. L'EDS-MICS a été réalisée avec l'appui financier du Gouvernement du Cameroun, de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), du Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), et de la Banque Mondiale. D'autres institutions ont également apporté leur expertise à la réalisation de cette opération, en particulier le Centre Pasteur du Cameroun (CPC) pour la réalisation des tests du VIH. En outre, ICF International a fourni l'assistance technique par le biais du programme MEASURE DHS, programme financé par l'USAID et dont l'objectif est de fournir un support et une assistance technique à des pays du monde entier pour la réalisation d'enquêtes sur la population et la santé.

Photo de couverture avec la permission de l'UNICEF



Santé de l'enfant

