

## المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS)

٩١٪ من الأطفال في الفئة العمرية ١٨-٢٩ شهراً تم تطعيمهم بكافة التطعيمات الأساسية - الدرن والحصبة والتطعيم الثلاثي (الدفترية والسعال الديكي والتيتانوس) والجرعات الثلاثة لشلل الأطفال.

### انتشار وعلاج الإسهال

نسبة الأطفال دون الخامسة من العمر الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين السابقين على المسح


نسبة الأطفال المصابين بالإسهال والذين تلقوا العلاج



تلقي أكثر من نصف الأطفال المصابين بالإسهال العلاج أو النصيحة، ٣٧٪ من هؤلاء الأطفال تم علاجهم بالمضادات الحيوية رغم أن هذه الممارسة غير موصى بها.

في الأسبوعين السابقين على المسح، كان ١٤٪ من الأطفال دون الخامسة من العمر مرضى بالسعال وسرعة التنفس وهي أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد. ٦٨٪ من بين هؤلاء الأطفال تم عرضهم على وحدة صحية أو مقدم خدمة للحصول على المشورة أو العلاج، وتم إعطاء ٦٣٪ منهم مضادات حيوية بينما ٢٠٪ منهم لم يتلقوا أي مشورة أو علاج.

وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر حسب محل الإقامة والوفيات لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال فترة الـ ١٠ سنوات السابقة على المسح




\*لا تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء

وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر تتراوح بين الأقل وهو ٢٠ حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي في المحافظات الحضرية إلى الأعلى وهو ٣٨ حالة وفاة لكل ١٠٠٠ مولود حي في الوجه القبلي.

### وفيات الأطفال حسب فترات المباشرة بين الولادات

الوفيات لكل ١٠٠٠ مولود حي خلال الـ ١٠ سنوات السابقة على المسح



نسبة وفيات الأطفال الرضع المولودين بعد أقل من سنتين من الولادة السابقة تزيد أكثر من ٣ مرات عن نسبة وفيات الأطفال الرضع المولودين بعد ٣ سنوات من الولادة السابقة.


قدم المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) أحدث البيانات لمتابعة الوضع السكاني والصحي في مصر. وهو المسح السكاني الصحي العاشر الذي يتم تنفيذه في مصر.

وقد تم جمع بيانات المسح عن طريق سؤال ٢٨,١٧٥ من الأسر المعيشية المختارة و٢١,٧٦٢ سيدة سبق لها الزواج في الفئة العمرية من ١٥-٤٩ حول وفيات الأطفال والتطعيمات والأمراض المعدية وختان الإناث.

### الاتجاهات الإحصائية للوفيات في مرحلة الطفولة

الوفيات لكل ١٠٠٠ مولود حي

مسح ٢٠١٤ (٢٠١٤ - ٢٠١٠) مسح ٢٠٠٨ (٢٠٠٨ - ٢٠٠٤) مسح ٢٠٠٥ (٢٠٠٥ - ٢٠٠١)



على الرغم من انخفاض معدل وفيات الأطفال في الفترة السابقة، إلا أن وفيات الأطفال قد تغيرت قليلاً منذ عام ٢٠٠٨.

# صحة الطفل

للحصول على معلومات إضافية عن نتائج المسح السكاني الصحي لمصر (EDHS) عن عام ٢٠١٤، نرجو الإتصال:

## في جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان

شارع مجلس الشعب

القاهرة، مصر

الهاتف: ٢٠-٢-٢٧٩٤٨٥٥٥

فاكس: ٢٠-٢-٢٧٩٢٤١٥٦

## في الولايات المتحدة الأمريكية

برنامج DHS، مؤسسة ICF الدولية

٣٠ طريق غاثير، جناح ٥٠٠

روكفيل، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية

تليفون: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠٠

فاكس: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠١

بريد الإلكتروني: reports@dhsprogram.com

موقع الأنترنت: http://www.dhsprogram.com


المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) قد تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصحة بواسطة شركة الزناتي ومشاركوه. ويعتبر المسح جزءاً من برنامج المسوح السكانية الصحية والذي يتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقد كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / القاهرة هي الممول الرئيسي لهذا المسح، كما تم تقديم الدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

التقطت صورة الغلاف بواسطة يسرى عقل / اليونيسيف ©٢٠١٣

## ختان الإناث حسب محل الإقامة

نسبة الفتيات في الفئة العمرية ١٩-٠ المختنات والمتوقع ختانهن في المستقبل




ختان الإناث له مخاطر صحية قد تؤدي إلى وفاة الفتيات الصغيرات. وقد ذكرت الأمهات أن أكثر من نصف الفتيات في الفئة العمرية ١٩-٠ من المتوقع أن يتم ختانهن عند سن البلوغ. وترتفع النسب المتوقعة لختان الإناث في الوجه القبلي، كما تزيد في المناطق الريفية عن مناطق الحضر.

## المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤




## المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS)

معظم الشباب يلتحقون بالتعليم الثانوي  
نسبة السكان في الفئة العمرية (١٢-١٧) والملتحقين بالتعليم الثانوي



### عنف الأزواج


نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (١٥-٤٩) واللاتي تعرضن لأحد أشكال العنف التالية من قبل أزواجهن



واحدة من كل أربعة سيدات ذكرن تعرضهن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن.

### التأمين الصحي حسب محل الإقامة

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (١٥-٤٩) ولديهن تأمين صحي



\* لا تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء

غالبية السيدات وخاصة في المناطق الريفية ليس لديهن أي تأمين صحي.

يمثل التدخين السلبي خطراً صحياً على كل أفراد الأسرة. الرضع والأطفال الذين يتعرضوا للتدخين السلبي يزيد لديهم خطر الإصابة بالتهابات الأذن والأمراض التنفسية وصعوبة نضوج الرئتين.

في ٤٥٪ من المنازل في مصر هناك شخص يدخن بشكل يومي.

قدم المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) أحدث البيانات لمتابعة الوضع السكاني والصحي في مصر. وهو المسح السكاني الصحي العاشر الذي يتم تنفيذه في مصر منذ ١٩٨٨.

وفي هذا المسح تم سؤال كل الأسر المعيشية المختارة حول التعليم وكيفية الحصول على الرعاية الصحية. كما تم سؤال ما يقرب من ٦,٧٠٠ سيدة حول تجاربهن مع العنف المنزلي. وتم سؤال حوالي ٢٢,٠٠٠ شخص بالغ حول الطرق المستخدمة في ضبط سلوك الأطفال في أسرهم.

### الحصول على الرعاية الصحية

نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية (١٥-٤٩) وواجهن مشكلات في الحصول على الرعاية الصحية



ذكرت أكثر من ثلثي السيدات وجود مشكلات في الحصول على الرعاية الصحية. وعلى الأغلب، فإن السيدات كان لديهن تخوف بأن الوحدات الصحية لن يكون بها الأدوية اللازمة أو مقدم الخدمة الصحية.



# رفاهية الأسرة

للحصول على معلومات إضافية عن نتائج المسح السكاني الصحي لمصر (EDHS) عن عام ٢٠١٤، نرجو الإتصال:

## في جمهورية مصر العربية

وزارة الصحة والسكان  
شارع مجلس الشعب  
القاهرة، مصر  
الهاتف: ٢٠-٢-٢٧٩٤٨٥٥٥  
فاكس: ٢٠-٢-٢٧٩٢٤١٥٦

## في الولايات المتحدة الأمريكية

برنامج DHS، مؤسسة ICF الدولية  
٣٠ طريق غاثير، جناح ٥٠٠  
روكفيل، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية  
تليفون: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠٠  
فاكس: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠١

بريد الإلكتروني: reports@dhsprogram.com  
موقع الأنترنت: http://www.dhsprogram.com

## المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤



المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) قد تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصحة بواسطة شركة الزناتي ومشاركوه. ويعتبر المسح جزءاً من برنامج المسوح السكانية الصحية والذي يتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وقد كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية /القاهرة هي الممول الرئيسي لهذا المسح، كما تم تقديم الدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

التقطت الصورة بواسطة عمر محسن، ٢٠٠٣، مسموح بتداولها



وزارة الصحة والسكان




El-Zanaty and Associates



## الإتجاهات نحو ضرب الزوجة


نسبة السيدات المتزوجات في الفئة العمرية ١٥-٤٩ اللاتي يوافقن على أن ضرب الزوج لزوجته مبرر للأسباب التالية:



أكثر من ثلث السيدات تعتقدن أن ضرب الزوجة مبرر أحياناً.

## طرق ضبط سلوك الأطفال

نسبة الأطفال في الفئة العمرية ١-١٤ والذين تعرضوا لأحد طرق ضبط السلوك خلال الشهر السابق على المسح



خلال الشهر السابق على المسح، تم ضبط سلوك ٩٣٪ من الأطفال بطريقة عنيفة. وتتراوح الطرق العنيفة من الصياح أو الصراخ وصولاً للعقاب الجسدي الشديد الذي يتضمن ضرب الطفل على الوجه أو الرأس أو الأذن أو ضرب الطفل بشكل متكرر وبأقصى ما يمكن.


## المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS)

قدم المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) أحدث البيانات لمتابعة الوضع السكاني والصحي في مصر. وهو المسح السكاني الصحي العاشر الذي يتم تنفيذه في مصر.

وقد تم جمع بيانات المسح عن طريق سؤال ٢٨,١٧٥ من الأسر المعيشية المختارة و٢١,٧٦٢ سيدة سبق لها الزواج في الفئة العمرية من ١٥-٤٩ حول رعاية الحمل والرعاية أثناء الولادة ورعاية ما بعد الولادة والخصوبة.

### رعاية الحمل المنتظمة طبقاً لمؤشر الثروة

نسبة الأمهات اللاتي حصلن على ٤ زيارات رعاية الحمل أو أكثر خلال فترة الحمل لأخر مولود خلال فترة الـ ٥ سنوات السابقة على المسح



تحصل السيدات الأكثر فقراً على الرعاية أثناء الحمل بنسب أقل من السيدات الأغنى.


### مكونات رعاية الحمل



تلقت معظم السيدات الحوامل طرق الفحص الروتينية أثناء رعاية الحمل، ولكن أقل من النصف ذكرن أنه تم إعطائهن معلومات عن علامات مضاعفات الحمل.

### تطور رعاية الولادة

نسبة الولادات في الـ ٥ سنوات السابقة على المسح




\*أشرف عليها طبيب أو ممرضة/قابلة

إرتفعت باضطراد المساعدة الطبية أثناء الولادة منذ عام ٢٠٠٠. وزادت نسبة الولادات القيصرية - التي تمثل خطراً على الأمهات والأطفال - بشكل ملحوظ منذ عام ٢٠٠٨.

### مكان الولادة


نسبة المواليد الأحياء في الـ ٥ سنوات السابقة على المسح



أغلب الولادات تمت في منشأة صحية خاصة.

### الولادات في المنزل حسب محل الإقامة

نسبة الولادات في المنزل خلال الـ ٥ سنوات السابقة على المسح



\*لا تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء

واحدة لكل خمسة ولادات بالوجه القبلي تمت في المنزل.

# صحة الأم

للحصول على معلومات إضافية عن نتائج المسح السكاني الصحي لمصر (EDHS) عن عام ٢٠١٤، نرجو الإتصال:

في جمهورية مصر العربية  
وزارة الصحة والسكان  
شارع مجلس الشعب  
القاهرة، مصر  
الهاتف: ٢٠-٢-٢٧٩٤٨٥٥٥  
فاكس: ٢٠-٢-٢٧٩٢٤١٥٦

في الولايات المتحدة الأمريكية  
برنامج DHS، مؤسسة ICF الدولية  
٣٠ طريق غاثير، جناح ٥٠٠  
روكفيل، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية  
تليفون: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠٠  
فاكس: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠١  
بريد الإلكتروني: reports@dhsprogram.com  
موقع الأنترنت: http://www.dhsprogram.com

## المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤


المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) قد تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصحة بواسطة شركة الزناتي ومشاركوه. ويعتبر المسح جزء من برنامج المسوح السكانية الصحية والذي يتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وقد كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / القاهرة هي الممول الرئيسي لهذا المسح، كما تم تقديم الدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

التقطت صورة الغلاف بواسطة يسرى عقل / اليونيسيف@٢٠١٣

يصل متوسط عدد المواليد لكل سيدة ٣,٥ طفل وتمثل زيادة منذ عام ٢٠٠٨. وتمثل الولادات للسيدات الأصغر من ٢٠ سنة والأكبر من ٣٥ سنة خطورة على صحة الأم والرضع. وواحد من كل ٨ ولادات حديثة في مصر تكون بين السيدات الأكبر. و ١١٪ من الفتيات المتزوجات في الفئة العمرية ١٥-١٩ إما حوامل أو أنجبن بالفعل.

### المباعدة بين الولادات بالشهور

نسبة المباعدة بين الولادات غير الولادة الأولى بالشهور خلال الـ ٥ سنوات السابقة على المسح



المباعدة بين الولادات لفترة أقل من ٣٦ شهر يمكن أن يضر صحة الأمهات والأطفال.

### الحاجة غير الملباه لتنظيم الأسرة

نسبة السيدات المتزوجات حالياً في الفئة العمرية (١٥-٤٩)



تستخدم أكثر من نصف السيدات طرق حديثة لمنع الحمل وبالتالي هي تقريبا نفس النسبة لعام ٢٠٠٨. وبالرغم من ذلك، فواحدة من بين ٨ سيدات لديها حاجة غير ملباه لتنظيم الأسرة.



El-Zanaty and Associates






## المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS)

### التقزم حسب محل الإقامة

نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من التقزم بشكل متوسط أو شديد




\* محافظات الحدود

لا تشمل محافظات شمال وجنوب سيناء


ينتشر التقزم أكثر في الوجه القبلي ويقل إنتشاره في محافظات الحدود.

### تطور الحالة التغذوية للأطفال

نسبة الأطفال دون الخامسة



تتشابه نسب التقزم ونقص الوزن في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥. وهناك زيادة بسيطة في نسبة حالات النحافة بمرور الوقت.



### الأغذية المكملة

يحصل ٧٧٪ من الأطفال في الفئة العمرية من ٦-٨ أشهر على أغذية مكملة كما هو موصى به.

### الحالة التغذوية للأطفال

نسبة الأطفال

متوسط حد



يعاني واحد من كل خمسة أطفال من التقزم وهذه علامة من علامات سوء التغذية المزمنة، ويعاني أقل من ١٠٪ من الأطفال من النحافة وهو دليل علي سوء التغذية الحاد، ويدل نقص الوزن على سوء التغذية المزمن أو الحاد أو كلاهما.

قدم المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) أحدث البيانات لمتابعة الوضع السكاني والصحي في مصر. وهو المسح السكاني الصحي العاشر الذي يتم تنفيذه في مصر.


وقد تم جمع بيانات المسح عن طريق سؤال ٢٨١٧٥ من الأسر المعيشية المختارة و٢١٧٦٢ سيدة سبق لها الزواج في الفئة العمرية من ١٥-٤٩ حول الحالة التغذوية بين السيدات والأطفال.

### الرضاعة الطبيعية في مصر

٩٦٪ من الرضع سبق لهم الرضاعة الطبيعية فقط ٤٠٪ من الرضع حصلوا على الرضاعة الطبيعية المطلقة حتى سن ٦ أشهر كما هو موصى به.

### الرضاعة الطبيعية المطلقة طبقا لعمر الطفل

نسبة الرضاعة الطبيعية المطلقة



الرضاعة الطبيعية المطلقة هي الأعلى في الشهر الأول بعد الولادة، في سن ٤-٥ أشهر، حوالي ١٣٪ فقط من الرضع يستمرون على الرضاعة الطبيعية المطلقة.

# الحالة التغذوية

للحصول على معلومات إضافية عن نتائج المسح السكاني الصحي لمصر (EDHS) عن عام ٢٠١٤، نرجو الإتصال:

في جمهورية مصر العربية  
وزارة الصحة والسكان  
شارع مجلس الشعب  
القاهرة، مصر  
الهاتف: ٢٠٠-٢-٢٧٩٤٨٥٥٥  
فاكس: ٢٠٠-٢-٢٧٩٢٤١٥٦

في الولايات المتحدة الأمريكية  
برنامج DHS، مؤسسة ICF الدولية  
٣٠ طريق غاثير، جناح ٥٠٠  
روكفيل، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية  
تليفون: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠٠  
فاكس: ١-٣٠١-٤٠٧-٦٥٠١  
بريد الإلكتروني: reports@dhsprogram.com  
موقع الأنترنت: http://www.dhsprogram.com

المسح السكاني  
الصحي - مصر  
٢٠١٤



المسح السكاني الصحي - مصر ٢٠١٤ (EDHS) قد تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الصحة بواسطة شركة الزناتي ومشاركوه. ويعتبر المسح جزءاً من برنامج المسوح السكانية الصحية والذي يتم تمويله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وقد كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية /القاهرة هي الممول الرئيسي لهذا المسح، كما تم تقديم الدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

التقطت الصورة بواسطة ديورا دولي، ٢٠٠٣، مسموح بنداؤها




El-Zanaty and Associates




٨٥٪ من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج  
تعانين من الوزن الزائد أو السمنة

نسبة توزيع السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية ١٥-٤٩



التغذية بالنسبة لصغار الشباب

نسبة الذكور والإناث في الفئة العمرية ١٩-٥




يعاني ثلث عدد صغار الشباب والشابات اللذين لم يسبق لهم الزواج من الوزن الزائد أو السمنة.

واحد من بين كل أربعة سيدات وأطفال مصابون بالأنيميا

الأطفال في المرحلة العمرية من ٦-٥٩ شهراً

والسيدات في الفئة العمرية ١٥-٤٩ سنة والمصابون بالأنيميا



أي نوع من الأنيميا أنيميا متوسطة أو حادة أنيميا بسيطة أنيميا من الأنيميا